

Caractéristiques des événements thromboemboliques dans la sclérodermie systémique

Maladie veineuse thromboembolique au cours de la sclérodermie systémique

1^{er} Auteur : Maysam, jridi, Assistante , Service de Medecine interne , CHU La Rabta , Tunis, Tunisie

Autres auteurs, équipe:

- Maha, Rebai , Résidente, service de médecine interne, CHU la Rabta, Tunis, Tunisie
- Ines, Naceur, Professeur agrégé , Service de médecine interne, CHU la Rabta, Tunis, Tunisie
- Tayssir, Ben Achour, Assistante, Service de médecine interne , CHU La Rabta, Tunis, Tunisie
- Monia, Smiti, Professeur, service de médecine interne, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie
- Fatma ,Said, Professeur ,service de médecine interne, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction

La sclérodermie systémique (SCS) est une connectivite, potentiellement grave et invalidante caractérisée par la survenue de phénomène de fibrose et d'oblitération vasculaire. L'association entre la sclérodermie et la maladie veineuse thromboembolique (MVTE) a été décrite dans la littérature

Méthodes


- Etude descriptive, rétrospective
- lieux: service de médecine interne au CHU la Rabta.
- Durée: de 1998 a 2024
- Les critères d'inclusions :
 - * Patients adultes
 - * SCS selon les critères ACR/ EULAR 2013 et
 - * patients ayant une maladie veineuse thromboembolique confirmée par imagerie (écho-doppler veineux / angioscanner).

Résultats




Sexe ratio : 1 H/6,5 F.

- L'Age moyen au moment du diagnostic de SCS était de 50 ans et au moment de la MVTE était de 49 ans



MVTE chez les patients SCS




Maladies auto-immunes associées aux MVTE chez les patients ayant une SCS


Enquête étiologique :

- Enquête étiologique négative chez six patients (40%)
- TVP provoquée chez deux patients (13,3%)
- Varices des membres inférieurs chez deux patients (14,3%)
- une récurrence néoplasique est suspectée chez deux patients (13,3%) en raison de leurs antécédents de néoplasie

■ sclerose diffuse ■ PID ■ Atteinte digestive ■ HTAP



Le phénotype clinique des patients sclérodermique ayant une MVTE



Profil immunologique des patients atteints de SCS+MVTE

Conclusion

A travers cette étude de faible effectif nous avons pu relever , la prévalence de MVTE dans la SCS et le phénotype clinique associé. Il est primordial de mener des études prospectives pour mieux comprendre les mécanismes sous- jacents aux événements thromboemboliques dans la SCS.