

Profil de l'atteinte ophtalmologique de la maladie de Behçet au CHU Mohammed VI TANGER: à propos de 57 cas

SOUMAYA ELBACHIRI, Professeur assistant, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
OUSSAMA BOUKOUK, médecin résident, service d'ophtalmologie, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
RACHID SMAILI, médecin spécialiste, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
WYSSAL CHAWAD, Professeur assistant, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
NAOUAL DALHI, médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
NAOUAL EL OUARTI, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
IKRAM RAAIDI, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
ZHOR MRIKA, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
RANDA AIT AMRAN, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
AABYR AL ASFAR, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
KAOUTAR DAOUDI, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
HIND STITOU, , médecin résident, service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
MERIEME BAHLOUL, Cheffe de service d'ophtalmologie, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.
MYRIEM BOURKIA, cheffe de service de service de médecine interne, CHU Mohammed VI TANGER, Maroc.

Introduction

La maladie de Behçet est une vascularite systémique qui touche des vaisseaux de tout calibre et évolue selon un mode de poussée rémission. L'atteinte oculaire de la maladie de Behçet est fréquente et potentiellement grave puisqu'elle peut se compliquer par une cécité, elle se présente généralement par une uvéite qui peut être antérieure, intermédiaire, postérieure ou pan uvéite. Notre objectif était de décrire le profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de l'atteinte oculaire de la maladie de Behçet au CHU MOUHAMED VI TANGER.


Matériels et méthodes

En recueillant les données pour la création du **registre régional de la maladie de Behçet au CHU MOUHAMED VI** Tanger, nous avons inclus l'ensemble des patients adultes suivis pour une maladie de Behçet avec une atteinte oculaire au service de médecine interne et au service d'ophtalmologie sur une période de 05 ans s'étalant d'avril 2019 à Avril 2024.


Résultats

- **Prévalence: 52,7% soit 57/108 patients.**
- **Moyenne d'âge: 37,1 ans.**
- **Sexe Ratio H/F: 3,07.**


Lésions associées



Latéralité




Signes cliniques




Siège	Fréquence
Panuvéite	82%
Postérieure	14%
Antérieure	2%
Intermédiaire	2%

Traitement



Evolution



Conclusion

L'atteinte oculaire de la maladie de Behçet non seulement fait partie des critères diagnostiques mais elle met en jeu le pronostic visuel en menant vers une cécité ce qui implique une bonne prise en charge thérapeutique efficace et rapide pour prévenir les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients.