

Atteinte rhumatologique au cours de la maladie de Behçet : à propos de 48 cas

-Rihèm, BOUKHZAR, Résidente, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
-Mehdi, SOMAI, MCA, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
-Imene, RACHDI, MCA, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
-Ibrahim, ARBAOUI, Assistant, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
-Basma, BEN DHAOU, Professeure, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
--Fatma, BOUSSEMA, Professeure, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
Zohra, AYDI, MCA, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE
Fatma, DAOUD, MCA, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur, Tunis, TUNISIE

Introduction

Les manifestations rhumatologiques sont fréquentes au cours de la maladie de Behçet (MB). L'atteinte articulaire occupe la troisième place après l'atteinte cutanéomuqueuse et oculaire. Elle peut même inaugurer la maladie. L'objectif de notre travail était de déterminer les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de l'atteinte articulaire au cours de la MB.

Patients et méthodes

Étude rétrospective menée sur une période de 21 ans, incluant des patients suivis dans notre service de médecine interne, répondant aux critères du Groupe d'étude international de la maladie de Behçet et ayant développé des manifestations rhumatologiques.

Résultats

L'atteinte articulaire de la MB était observée dans 48 cas. Elle était révélatrice dans 36 cas.

Elle survenait au cours de l'évolution dans 25 % des cas (n=12) après un délai moyen d'apparition par rapport au diagnostic de 65.1 mois (extrêmes : 2 et 156 mois).

L'âge moyen de début des signes articulaires était de 30,3 ans (extrêmes : 14 et 54 ans).

L'âge moyen au moment du diagnostic était de 32,13 ans (extrêmes : 15 et 65 ans).

Le sex-ratio homme/femme de l'atteinte articulaire était de 2,42 (34/14).

Dans ce groupe de patients, 45,8 % avaient un typage HLA B 51 positif (22 cas).

Les arthralgies de type inflammatoire, isolées ou associées à des arthrites, dominaient le tableau clinique avec une fréquence de 93,7 % des cas. L'arthrite a été retrouvée chez 28 cas. Il s'agissait d'une monoarthrite (14 cas), polyarthrite (3 cas) et oligoarthrite (2 cas). Les lombalgies de type inflammatoire étaient retrouvées chez 10 cas. 3 cas de kystes poplités ont été trouvés. Une sacroiliite documentée était présente chez 2 cas.

Conclusion

L'atteinte articulaire au cours de la MB est fréquente. Il s'agit le plus souvent d'arthralgies inflammatoires non destructrices touchant surtout les grosses articulations. Quand elle est inaugurale, et en l'absence d'autres manifestations associées, elle peut faire égarer le diagnostic.